


国药准字S20050088

重组人血管内皮抑制素注射液

Recombinant Human Endostatin Injection

恩度 ENDOSTAR

于2~8°C避光保存和运输



F4

【规格】15mg/3ml/支(2.4×10⁵U/支)

的III/IV期非小细胞肺癌患者。

【适应症】本品联合NP化治疗方案用于治疗初治或复治的III/IV期非小细胞肺癌患者。

【性状】本品为无色透明液体，PH 5.5±0.5。

【成份】重组人血管内皮抑制素

【用法用量】本品为静脉给药，临用时将本品加入250~500ml生理盐水中，匀速静脉点滴，滴注时间3~4小时。与NP化疗方案联合给药时，本品在治疗周期的第1~14日，每天给药一次，每次7.5mg/m²(1.2×10⁵U/m²)，连续给药14天，休息一周，再继续下一周期治疗。通常可进行2~4个周期的治疗。临床推荐医生在患者能耐受的情况下可适当延长本品的使用时间。

【不良反应】【禁忌】【注意事项】详见说明书。

【贮藏】于2~8°C避光保存和运输。

【成份】重组人血管内皮抑制素

【适应症】本品联合NP化疗方案用于治疗初治或复治的III/IV期非小细胞肺癌患者

【产品批号】

【生产日期】

20060801

【有效期】

2008年02月03日